



HÄNDE-/HAUT-  
DESINFIZIERUNGSMITTEL

# AHD2000<sup>®</sup>

Alkoholisches Hände- und  
Haut-Desinfektionsmittel

Désinfectant alcoolisé  
pour les mains et la peau

FACHINFORMATION



LYSOFORM

## FACHINFORMATION

**AHD 2000**<sup>®</sup>  
Gebrauchsfertig

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 79,9 g Ethanol 96%; Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Macrogolglycerolcocoate, Geruchsstoffe, Milchsäure, Gereinigtes Wasser.

**Darreichungsform:** Lösung zur Anwendung auf der Haut

**Anwendungsgebiete :** Chirurgische Händedesinfektion. Hygienische Händedesinfektion. Hautdesinfektion von unverletzter Haut.

**Dosierung/Art der Anwendung:** Äußerlich unverdünnt anwenden!  
Bakterizid (inkl. TbB), fungizid, begrenzt viruzid\* (inkl. HBV/HCV/HIV), Rotavirus, Adenovirus: 30 sek.\*\*

\* gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004.

Hygienische Hände-Desinfektion: konz. 30 sek.  
Chirurgische Hände-Desinfektion: konz. 1,5 min.  
Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.

Haut-Desinfektion: Anwendung an talgdrüsenarmer Haut: vor Punktion und Injektion – konz. mind. 15 sec.; vor Punktion von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen, sowie vor operativen Eingriffen: konz. mind. 1 min.; Anwendung an talgdrüsenreicher Haut: vor allen Eingriffen: konz. mind. 1 min.

Zur Anwendung von **AHD 2000**<sup>®</sup> bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Bei Säuglingen und Kleinkindern nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden. Bei sachgemäßer Anwendung sind jedoch keine Nebenwirkungen zu erwarten.

**Gegenanzeigen:**  
Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

**Wechselwirkungen:**  
Keine bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Bei sachgemäßem Gebrauch kann **AHD 2000**<sup>®</sup> während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

## Nebenwirkungen:

Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Brennen) kommen. Allergische Reaktionen sind sehr selten: (<0,01 % oder unbekannt). Zur Vorbeugung einer Entfettung der Haut empfiehlt es sich nach der Arbeit und in den Arbeitspausen die Hände einzucremen. Bei stärkeren Hautirritationen bitte einen Arzt aufsuchen!

### „Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen:

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzuzeigen“.

## Überdosierung / Anwendungsfehler:

Nicht in offenen Wunden und auf Schleimhäuten anwenden. Falls das Präparat in Kontakt mit Schleimhäuten (z.B. Augen, Rachen, Magen etc.) oder offenen Wunden gekommen ist, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Falls **AHD 2000® eingenommen** worden ist: zur Verdünnung des Präparates sofort reichlich Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen!

## Pharmakotherapeutische Gruppe:

ATC-Code: D08

## Pharmazeutische Angaben:

Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen („Sterilbank“) erfolgen. Haltbarkeit: Bei Einsatz des Präparates in Wandspendersystemen: Bei Einsatz des Präparates in Wandspendersystemen 8 Monate, jedoch nicht über das Verfallsdatum hinaus. Stets Kennzeichnung des Behältnisses beachten!

## Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen:

Arzneimittel nicht über 25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden! Flammpunkt nach DIN 51 755: 19°C. Leicht entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen!

## Art und Inhalt des Behältnisses:

HDPE-Behältnisse.

Packungsgröße: 125 ml, 250 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 5 Liter

## Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller/Inhaber der Zulassung

Firma Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Straße 133

12247 Berlin, Tel.: 030-77 99 2-0, Telefax 030-77 99 22 19

## Zulassungsnummer:

Zul.-Nr.: 6339804.00.00 erteilt am 22.07.2004

## Stand der Information:

Februar 2015