

Poly-Alcohol Haut...farblos/gefärbt Antisepticum

Seite 1



gebrauchsfertiges Hautantisepticum zur präoperativen Behandlung der Haut, vor Inzisionen, Punktionen und Injektionen

Anwendungsbereiche:

Poly-Alcohol Haut... farblos/gefärbt Antisepticum ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur präoperativen Behandlung der Hautpartien sowie zur Verwendung als Hautantisepticum vor Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Es zeichnet sich durch eine schnelle Wirksamkeit aus und unterstützt eine gute Hauthaftung bei der Verwendung von OP-Folie.

Das farblose Produkt kann bei Bedarf auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden.

Poly-Alcohol Haut-Antisepticum ist je nach Bedarf und Anwendungsbereich als farblose und gefärbte Lösung erhältlich.

Besondere Eigenschaften:

- breites Wirkungsspektrum
- schnelle und sichere Wirkung
- angenehm im Geruch
- farblose und gefärbte Variante erhältlich

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid*

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 ml enthalten:
70 ml 2-Propanol

Anwendungsempfehlung:

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Hautdesinfektion DGHM-Standardmethoden		
Talgdrüsenarme Haut:		
• vor Injektionen und Punktionen	unverdünnt	15 s
• vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen, sowie operativen Eingriffen	unverdünnt	60 s
Talgdrüsenreiche Haut:		
• vor Punktionen und Operationen	unverdünnt	3 min
VAH – Händedesinfektion DGHM / EN-Standardmethoden (farblos)		
VAH – hygienische Händedesinfektion DGHM / EN 1500	unverdünnt	30 s
VAH – chirurgische Händedesinfektion DGHM / EN 12791	unverdünnt	1,5 min
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	30 s
Vacciniavirus	unverdünnt	30 s
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	30 s
RKI-Listung (farblos)		
Wirkungsbereich A	unverdünnt	30 s

* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit / klare, orangerote Flüssigkeit
Geruch: alkoholisch
pH-Wert: 6 - 8 bei 20 °C
Dichte: ca. 0,876 g/cm³ bei 20 °C
Flammpunkt: 21,5 °C gem. DIN 51755

Listung:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste
- RKI-Liste Wirkungsbereich A (farblos)

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG



Qualitätsmanagement
ISO 9001



Qualitätsmanagement
EN ISO 13485

ANTISEPTICA Austria GmbH

A-1020 Wien, Wehlstraße 150 / Haussteinstraße, Top 61
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Poly-Alcohol Haut...farblos/gefärbt Antisepticum

Seite 2

Bezeichnung:

Poly-Alcohol Haut...farblos/
gefärbt Antisepticum

Zusammensetzung:

100 ml Lösung zur Anwendung auf der
Haut enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol 70,0 ml

Sonstige Bestandteile: gereinigtes

Wasser, Butan-1,3-diol, Parfümöl Fresh

Gefärbt: Gelborange S, Chinolingelb

Pharmazeutischer Unternehmer:

ANTISEPTICA chem. pharm. Prod. GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7
50259 Pulheim

Anwendungsgebiete:

Zur Hautdesinfektion vor Operationen,
Inzisionen, Punktionen und Injektionen
sowie zur hygienischen und chirurgischen
Händedesinfektion (farblos).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Zur Hautdesinfektion

unverdünnt auf die Haut auftragen.

Talgdrüsenarme Haut

- vor Injektionen und Punktionen
15 Sekunden feucht halten.
- vor Punktionen von Gelenken,
Körperhöhlen, Hohlorganen sowie
operativen Eingriffen mindestens
60 Sekunden feucht halten.

Talgdrüsenreiche Haut

- vor Punktionen und Operationen
mindestens 3 Minuten feucht halten.

Zur hygienischen Händedesinfektion

(farblos) unverdünnt in die Hände
einreiben, diese während 30 Sekunden
feucht halten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion

(farblos) unverdünnt in die Hände und
auf die Unterarme einreiben, diese
während 1,5 Minuten feucht halten.

Eine begrenzt viruzide Wirkung wird
in-vitro nach 30 Sekunden erzielt.

Gegenanzeigen:

Dieses Arzneimittel darf nicht ange-
wendet werden, wenn Sie allergisch
gegen 2-Propanol, oder einen der
sonstigen Bestandteile sind. Nicht auf
der Schleimhaut oder im Augenbereich
anwenden.

Nebenwirkungen:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind
Hautirritationen oder Hauttrockenheit
sowie kontaktallergische Reaktionen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder
Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen
bemerken, die nicht in dieser
Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Kontakt mit den Augen sollte vermieden
werden. Bei versehentlichen Spritzern ins
Auge sofort gründlich mit viel Wasser
ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Die enthaltenen Duftstoffe können
allergische Reaktionen auslösen.

Bei Säuglingen darf dieses Arzneimittel
nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet
werden.

Wechselwirkungen mit anderen

Arzneimitteln:

Keine bekannt.

Zur Beachtung:

Alkohohlaltig, brennbar. Vor Anwendung
elektrischer Geräte Hände gut trocknen
lassen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.

Lieferformen:

- Karton mit 30 x 200 ml Sprühflaschen
- Karton mit 10 x 1 L Flaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern

zusätzlich lieferbar:

- Wandspender für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe für 1 L Flaschen
- Dosierpumpe für 5 L Kanister

Pharmazentralnummern:

farblos

- 200 ml: PZN 05905148
- 1 L: PZN 05905131

gefärbt

- 200 ml: PZN 05905160
- 1 L: PZN 05905154

Das Präparat wird hergestellt in Überein-
stimmung mit den internationalen Quali-
tätsmanagementsystemen ISO 9001 und
EN ISO 13485.

Beim Umgang mit dem Produkt sind die
Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung
im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
Anfrage bei Ihrem Fachberater oder
auf unserer Homepage.

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen.*

Zugelassenes Arzneimittel gem. AMG
Zulassungsnr. farblos: 2931.00.00
Zulassungsnr. gefärbt: 2930.00.00

Biozid gem. Biozid-Verordnung
Farblos: BAuA Reg.-Nr.: N-43808
Gefärbt: BAuA Reg.-Nr.: N-43807

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7

Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11

E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG

ANTISEPTICA Austria GmbH

A-1020 Wien, Wehlistraße 150 / Haussteinstraße, Top 61

Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66

E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at



Qualitätsmanagement
ISO 9001



Qualitätsmanagement
EN ISO 13485

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft